

Maand	Maatregelen	Aanleiding
Januari	3 weken na de oxaalzuur behandeling in december mag er idealiter niet meer dan een 0.5 varroamijt per dag vallen. Je kunt het beste de mijten over een periode van 5 dagen tellen en dan de gemiddelde mijtenval per dag berekenen.	De oxaalzuur behandeling
Februari		
Maart	Tijdens de voorjaarsinspectie het 1 ^e bouwraam inhangen op positie 2 of 9 in de bovenste broedkamer. Na 2 weken uitsnijden (mits 2/3 gesloten) en terug plaatsen. Tot 2 ^e helft van juni hiermee doorgaan.	Voorjaarsinspectie, of het gesloten darrenbroed in bouwraam
April		
Mei	Jonge volken opzetten of kunstzwermen maken. Direct in broedloze periode met 3% oxaalzuur druppelen of besproeien	Volksverjonging
Juni	Dagelijkse mijtenval monitoren, bij meer dan 3 mijten per dag extra aandacht en behandelen met varromed.	Mijten tellen op schuiflade
Juli	Dagelijkse mijtenval monitoren, bij meer dan 10 mijten per dag extra aandacht en behandelen met varromed of mierenzuur, bij poeder of spoelmethode is de maximale toelaatbare grens 5 mijten per 100 bijen	Mijtenval monitoren of poedersuiker methode toepassen
Augustus	Eind juli, begin augustus de hoofdvolk de zomerbehandeling geven, jonge volken pas eind augustus begin september behandelen. Thymovar of Apiguard in juli al toedienen, Varromed en mierenzuur mogen begin augustus	Mijten tellen op schuiflade
September	Dagelijkse mijtenval monitoren, bij meer dan 10 mijten per dag nogmaals Varromed of 2 ^e keer mierenzuur toepassen	Mijten tellen op schuiflade
Oktober	Mijtenval monitoren, 1 mijt per dag is normaal, tot 10 mijten per dag extra aandacht, bij > 10 mijten per dag Varromed of mierenzuur toepassen. In de 2 ^e helft van november niet meer behandelen, uitstel tot de winterbehandeling van december.	Mijten tellen op schuiflade
November		
December	21 dagen na 3 dagen vorst zijn de meeste volken broedvrij, dan volgt de winterbehandeling met oxaalzuur. In ieder geval voor de jaarwisseling uitvoeren	